

**FORMULA:**

Cada 100 ml contienen:

Sulfametoxazol	2.500 g
Trimetoprim	0.500 g
Sulfato de neomicina equivalente a de neomicina base	0.725 g
Caolín coloidal	10.000 g
Pectina cítrica	0.500 g
Metilbromuro de homatropina	0.010 g
Vehículo cbp	100 ml

Contenido neto: Frasco con 60 ml  
10 frascos con 60 ml  
12 frascos con 250 ml

**STOP-ON**

Registro SAGARPA  
Q-7833-078

USO VETERINARIO

Antidiarreico

CONSULTE AL MEDICO  
VETERINARIO

**Su venta requiere receta médica**

Sulfametoxazol, Trimetoprim, Sulfato de  
neomicina, Caolín coloidal, Pectina cítrica y  
Metilbromuro de homatropina

SUSPENSION ORAL

LOTE No:

(LOGO PISA® AGROPECUARIA)  
®Marca Registrada

FECHA DE CADUCIDAD:

**Registros en otros países:**

HECHO EN MEXICO POR:  
PiSA Agropecuaria, S.A. de C.V.  
Calle 1 Norte, Manzana 2-25  
Parque Industrial Tula  
Atitalaquia, Hgo.

**INDICACIONES:**

Stop-On es una suspensión antidiarreica con acción antimicrobiana de amplio espectro y antiespasmódica, indicado para el tratamiento de las diarreas infecciosas agudas y subagudas en bovinos (becerros, productores de carne y leche), equinos, porcinos, ovinos, caprinos, perros y gatos, causadas por gérmenes susceptibles a la fórmula de Stop-On. La combinación de los principios activos de Stop-On actúa de manera rápida e integral.

**DOSIS:**

Bovinos (becerros, productores de carne y leche) y equinos: 60 a 120 ml;  
Porcinos: 10 a 30 ml;  
Ovinos y caprinos: 10 a 30 ml;  
Perros y gatos: 5 a 10 ml.  
Cada 12 horas durante 3 días a juicio del Médico Veterinario.

**VIA DE ADMINISTRACIÓN:**

Oral.

**ADVERTENCIAS:**

- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria, no se use en humanos.
- Consérvese en un lugar fresco.
- No se deje al alcance de los niños.
- Agite vigorosamente el producto antes de usarse.
- No deberá usarse este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados a consumo humano.
- Si la diarrea no desaparece en 3 días, reconfirmar su diagnóstico.
- No administrar en equinos destinados para consumo humano.